



Tecentriq (atezolizumab) : Risque de réactions cutanées sévères

MÉDICAMENTS - RISQUES MÉDICAMENTEUX - PUBLIÉ LE 01/04/2021

Information destinée aux spécialistes en oncologie, aux médecins compétents en cancérologie, aux cadres infirmiers des services hospitaliers et aux pharmaciens hospitaliers des établissements de santé concernés

Des réactions cutanées sévères, incluant des cas de syndrome de Stevens-Johnson et de nécrolyse épidermique toxique, ont été rapportées chez des patients traités avec Tecentriq® (atezolizumab).

En cas de suspicion de réaction cutanée sévère, les patients doivent être surveillés et les étiologies alternatives doivent être exclues. Le traitement doit être suspendu et les patients doivent être adressés à un médecin spécialisé en dermatologie pour un diagnostic et une prise en charge appropriée.

En cas de confirmation d'un syndrome de Stevens-Johnson ou d'une nécrolyse épidermique toxique, ainsi qu'en cas de toute éruption cutanée/réaction cutanée sévère de grade 4, le traitement par Tecentriq® (atezolizumab) doit être arrêté définitivement.

Tecentriq® (atezolizumab) doit être utilisé avec précaution chez les patients présentant un antécédent de réaction cutanée sévère ou mettant en jeu le pronostic vital lors d'un traitement antérieur par un autre médicament anticancéreux immunostimulant.

Le Résumé des Caractéristiques du Produit (RCP) sera mis à jour avec ces nouvelles informations de sécurité.



Consultez le courrier adressé aux professionnels de santé (01/04/2021)
(/uploads/2021/04/01/20210401-tecentriq-ii-54-dhpc-2.pdf)