AFIN DE LIMITER LE RISQUE DE FAUSSE ROUTE LORS DE L'ADMINISTRATION DU PRODUIT, IL EST PARTICULIÈREMENT IMPORTANT DE SUIVRE SCRUPULEUSEMENT LE MODE D'ADMINISTRATION DU PRODUIT.

MODE D'ADMINISTRATION CHEZ **LE NOUVEAU-NÉ À TERME** ET **LE NOURRISSON**

SCHEMA ①

SCHEMA ②

SCHEMA ③

UVESTEROL® D

1 500 UI/ml - SOLUTION BUVABLE

TOUJOURS ADMINISTRER LE PRODUIT **AVANT LA TÉTÉE OU LE BIBERON.**

UTILISER **EXCLUSIVEMENT** LA PIPETTE DOSEUSE POUR ADMINISTRATION ORALE FOURNIE DANS LA BOÎTE (SERINGOUTTE®).

A // ***Prélever à l'aide de la SERINGOUTTE®*** *la dose prescrite.*

B // ***Prendre l'enfant éveillé, l'installer en position semi-assise au creux du bras,*** *la tête reposée sur le bras.* (VOIR SCHEMA ①)

C // ***Introduire la pipette à environ 1 cm dans la bouche et la placer contre l'intérieur de la joue.*** *Laisser téter l'enfant, puis lui donner le sein ou le biberon. Si l'enfant ne tète pas,* ***appuyer très lentement sur le piston*** *de la pipette afin que le produit s'écoule* ***goutte à goutte*** *dans la bouche, puis lui donner le sein ou le biberon.* (VOIR SCHEMA ②)

ATTENTION : *Ne pas allonger l'enfant immédiatement après l'administration.*

La solution étant aqueuse, elle peut être administrée dans un biberon de faible volume avant la tétée.

D // ***En cas de reflux gastro-oesophagien, de problèmes digestifs ou de troubles de la déglutition, ne pas administrer pur,*** *mais dans une tétine adaptée à l'enfant après dilution dans 2 ml d'eau ou de lait selon le mode d'allaitement préconisé.* (VOIR SCHEMA ③)

Laisser l'enfant téter doucement la tétine et lui retirer la tétine une fois vide, puis lui donner le sein ou le biberon.

Rincer la Seringoutte® et la tétine à l'eau après chaque utilisation.

.....

.....

.....

.....

Votre tampon