

# Indications des antalgiques opioïdes

(tableaux non exhaustifs donnés à titre indicatif, 2019)

## Antalgiques opioïdes faibles

| Substances actives  | Indications   |
|---|---|
| Codéine en association<br>(paracétamol, paracétamol + aspirine,<br>paracétamol + caféine, ibuprofène) | Patients âgés de plus de 15 ans sur une courte durée pour des douleurs modérées non soulagées par d'autres antalgiques comme le paracétamol ou l'ibuprofène utilisés seuls.   |
| Dihydrocodéine  | Ce médicament peut être utilisé dans le traitement symptomatique des douleurs modérées chez l'adulte (à partir de 15 ans).  |
| Opium (poudre d')   | Traitement (chez l'adulte) des douleurs d'intensité modérée à intense et/ou qui ne sont pas soulagées par l'aspirine ou le paracétamol seul.  |
| Tramadol  | Ce médicament est indiqué dans le traitement des douleurs modérées à intenses de l'adulte; notamment après une intervention chirurgicale.   |
| Tramadol<br>+ paracétamol   | Indiqué dans le traitement des douleurs modérées à intenses lorsque votre médecin pense qu'une association de chlorhydrate de tramadol et de paracétamol est nécessaire. Réservé à l'adulte et l'adolescent à partir de 12 ans. |
| Tramadol<br>+ dexkétoprofène  | Utilisé dans le traitement symptomatique de courte durée de la douleur aiguë modérée à sévère chez l'adulte.  |

## Antalgiques opioïdes forts

| Substances actives                       | Indications   |
|--|---|
| Buprénorphine                            | Ce médicament est réservé aux situations nécessitant un soulagement rapide et efficace d'une douleur intense, par exemple en cas d'intervention chirurgicale.   |
| Fentanyl<br>à action prolongée           | Les patchs aident à soulager les douleurs très fortes et de longue durée :<br>· chez les adultes qui ont besoin d'un traitement continu de la douleur,<br>· chez les enfants à partir de l'âge de 2 ans qui ont déjà reçu des médicaments opioïdes et qui ont besoin d'un traitement continu de la douleur. |
| Fentanyl<br>à action rapide (citrate de) | Comprimé sublingual réservé aux patients adultes prenant déjà régulièrement des analgésiques puissants (opioïdes) pour traiter des douleurs cancéreuses chroniques, mais chez qui un traitement des accès douloureux paroxystiques est nécessaire.  |
| Hydromorphone                            | Ce médicament est préconisé dans les douleurs intenses d'origine cancéreuse en cas d'échec ou d'intolérance aux opioïdes forts.   |
| Morphine<br>(chlorhydrate/sulfate de)    | Ce médicament est préconisé dans les douleurs intenses ou rebelles aux antalgiques de niveau plus faible.   |
| Oxycodone                                | Utilisé pour le traitement des douleurs intenses qui ne peuvent être correctement traitées que par des analgésiques forts, notamment les douleurs cancéreuses.  |
| Péthidine                                | Traitement symptomatique des douleurs intenses et/ou ne répondant pas aux autres antalgiques.   |
| Tapentadol                               | Utilisé pour le traitement des douleurs aiguës modérées à sévères de l'adulte qui peuvent être traitées seulement par des antalgiques opioïdes.   |
| Nalbuphine                               | Ce médicament est utilisé en traitement de courte durée des douleurs moyennes à intenses. Il peut être également utilisé avant ou après une intervention chirurgicale.  |

