

Classes pharmacologiques	Populations		
	Adultes	Enfants	Femmes enceintes
<b>Traitement symptomatique des nausées et vomissements</b> (hors ceux pour traiter les nausées et vomissements chimio-induits)			
<b>De première intention</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Mesures hygiéno-diététiques</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Solutés de réhydratation orale</li> <li>Mesures hygiéno-diététiques</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Mesures hygiéno-diététiques</li> </ul>
<b>Antagonistes dopaminergiques</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Alizapride : (Plitican®)</li> <li>Métoclopramide : (Primpéran® et génériques)</li> <li>Métopimazine : (Vogalène® et Vogalib® <sup>(1)</sup>)</li> <li>Dompéridone : (Motilium®, Peridys® et génériques)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Alizapride</li> <li>Métopimazine</li> <li>Dompéridone formes orales solides et liquides</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Alizapride : <b>contre-indication</b></li> <li>Métoclopramide : peut être utilisé si nécessaire</li> <li>Métopimazine : à utiliser avec prudence pendant la grossesse en l'absence de données cliniques pertinentes</li> <li>Dompéridone : ne doit être utilisé que lorsque le bénéfice thérapeutique attendu le justifie</li> </ul>
<b>Antihistaminiques H1</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Dimenhydrinate (Nausicalm®) <sup>(2)</sup></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Dimenhydrinate (Nausicalm® : Enfants &gt;2 ans (sirop)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Dimenhydrinate : à envisager au cours de la grossesse que si nécessaire</li> </ul>