

Siklos® 100 mg
hydroxycarbamide

Siklos® 1 000 mg
hydroxycarbamide

*Fiche explicative
de la posologie
à remettre au patient*

Si vous devez prescrire à la fois
du **Siklos® 100 mg** et du **Siklos® 1 000 mg**,
assurez-vous que le patient et/ou son
soignant comprenne la prescription
afin d'éviter toute confusion entre
les 2 dosages et prévenir le potentiel
surdosage ou sous-dosage.
Utilisez cette fiche détachable pour illustrer
votre prescription.

Siklos® 100 mg

Comprimé pelliculé sécable
hydroxycarbamide



Siklos® 1000 mg

Comprimé pelliculé sécable
hydroxycarbamide



theravia

FICHE EXPLICATIVE DE LA POSOLOGIE SIKLOS®

Votre médecin vous donne cette « fiche explicative de la posologie » pour vous expliquer quels comprimés prendre chaque jour. Vous pouvez montrer cette fiche à votre pharmacien pour vous assurer de recevoir la dose quotidienne réellement prescrite.

Date:/...../.....

Complément explicatif de l'ordonnance médicale de :

Nom Prénom

Poids kg

Votre médecin vous a prescrit mg de SIKLOS® par jour.

Cela veut dire, prendre chaque jour :

Siklos® 100 mg

Chaque demi-comprimé est gravé d'un "H" sur une face
(«H» pour Hundred = 100 en anglais)

☐ 1/2 comprimé : 50 mg



☐ comprimé(s) entier(s) de 100 mg = mg



Boîte couleur OR

Code CIP : 3400941580574

Siklos® 1000 mg

Chaque quart de comprimé est gravé d'un "T" sur une face
(«T» pour Thousand = 1 000 en anglais)

☐ 1/4 comprimé : 250 mg



☐ 1/2 comprimé : 500 mg



☐ 3/4 comprimé : 750 mg



☐ comprimé(s) entier(s) de 1000 mg = mg




Boîte couleur ROUGE

Code CIP : 3400938101942

Merci de bien vouloir présenter cette fiche à votre pharmacien avec l'ordonnance.

Avant de prendre votre traitement, lisez le guide d'information destiné aux patients drépanocytaires traités par SIKLOS® ; il contient des informations importantes sur SIKLOS® et notamment sur les précautions de manipulation des comprimés.



Guide délivré par
votre médecin

ou téléchargeable :
<https://www.siklos.eu/fr>
ou QR code (voir ci-contre)

Déclarez immédiatement tout effet indésirable suspecté d'être dû à un médicament, ou tout risque d'erreur, erreur interceptée, ou erreur avérée sans effet auprès de votre Centre Régional de Pharmacovigilance ou sur <https://signalement.social-sante.gouv.fr/>



theravia

Siklos[®]

hydroxycarbamide

Existe sous 2 dosages différents :

100 mg et **1 000 mg**


Comment utiliser les morceaux de comprimé de SIKLOS[®] d'un jour à l'autre ?

Si vous avez besoin de demi ou quart de comprimé, en fonction de la prescription médicale, les comprimés peuvent être facilement cassés.

Remettre les parties non utilisées des comprimés dans le flacon et ranger le flacon dans la boîte, elles peuvent être utilisées dans les 3 mois.


Siklos[®] 100 mg

Scannez ce QR Code pour visualiser la désagrégation du comprimé Siklos[®] 100 mg



Siklos[®] 1 000 mg

Scannez ce QR Code pour visualiser la désagrégation du comprimé Siklos[®] 1 000 mg



TH-SIKRMP03FR Octobre 2023 - Version 7





theravia

16 rue Montrosier
92200 Neuilly sur Seine
France