MINISTÈRE
DES SOLIDARITÉS
ET DE LA SANTÉ
Liberté
Égalité
Fraternité

INTERACTIONS MEDICAMENTEUSES

PAXLOVID® contient du ritonavir, puissant inhibiteur du CYP3A et peut augmenter les concentrations plasmatique des médicaments métabolisés par le CYP3A

CONTRE – INDICATIONS *

Augmentation des concentrations du médicament concomitant

Antagonistes α-1 adrénergiques
- Alfuzosine

Anticancéreux
- Nératinib
- Vénétoclax

Antigoutteux
- Colchicine

Neuroleptiques
- Lurasidone
- Clozapine
- Pimozide
- Quétiapine

Analgésiques
- Péthidine
- Piroxicam
- Propoxyphène

Antibiotiques
- Acide fusidique

Antihistaminiques
- Astémizole
- Terfénadine

Hypolipémiants
- Lovastatine
- Simvastatine
- Lomitapide

Antiangoreux
- Ranolazine

Antiarythmiques
- Amiodarone
- Bépridil
- Dronédarone
- Encaïnide
- Flécaïnide
- Propaférone
- Quinidine

Dérivés de l'ergot de seigle
- Dihydroergotamine
- Ergonovine
- Ergotamine
- Méthylergonovine

Inhibiteurs PDE5
- Avanafil
- Sildénafil
- Vardénafil

Sédatifs/Hypnotiques
- Clorazépate
- Diazépam
- Estazolam
- Flurazépam
- Midazolam oral
- Triazolam

Diminution des concentrations de PAXLOVID®

Préparations à base de plante
- Millepertuis

Anticonvulsivants
- Carbamazépine
- Phénobarbital
- Phénytoïne

Anti-infectieux
- Rifampicine

* Les médicaments énumérés dans ces tableaux sont donnés à titre indicatif et ne sont pas considérés comme une liste exhaustive de tous les médicaments possibles susceptibles d'interagir avec PAXLOVID® (source RCP)

MINISTÈRE
DES SOLIDARITÉS
ET DE LA SANTÉ

Liberté
Égalité
Fraternité

INTERACTIONS MEDICAMENTEUSES

PAXLOVID® contient du ritonavir, puissant inhibeur du CYP3A et peut augmenter les concentrations plasmatique des médicaments métabolisés par le CYP3A

AUTRES INTERACTIONS ET FORMES D'INTERACTION *

*Tableaux issus du RCP donnés à titre indicatif et ne sont pas considérés comme une liste exhaustive de tous les médicaments possibles susceptibles d'interagir avec PAXLOVID®

Augmentation des concentrations du médicament concomitant

Anticancéreux
- Afatinib
- Abémaciclib
- Apalutamide
- Céritinib
- Dasatinib
- Nilotinib
- Vincristine
- Vinblastine
- Encorafenib
- Fostamatinib
- Ibrutinib

Inhibiteurs PDE5
- Tadalafil

Antipsychotiques
- Halopéridol
- Rispéridone
- Thioridazine

Analgésiques
- Buprénorphine
- Norbuprénorphine
- Fentanyl

Sédatifs/Hypnotiques
- Alprazolam
- Buspirone
- Midazolam inj
- Zolpidem

Antidépresseurs
- Amitriptyline
- Fluoxétine
- Imipramine
- Nortriptyline
- Paroxétine
- Sertraline
- Désipramine

Antiarythmiques
- Digoxine

Antihistaminiques
- Fexofenadine
- Loratadine

Antirétroviraux
- Amprénavir
- Atazanavir
- Darunavir
- Fosamprénavir
- Efavirenz
- Maraviroc

Hypolipémiants
- Atorvastatine
- Fluvastatine
- Pravastatine
- Rosuvastatine

Anti-infectieux
- Rifabutin
- Kétoconazole
- Itraconazole
- Erythromycine
- Bédaquiline
- Clarithromycine

Immunosuppresseurs
- Ciclosporine
- Tacrolimus
- Evérolimus

Inhibiteurs calciques
- Amlodipine
- Diltiazem
- Nifédipine

Agonistes β-2-adrénergique
- Salmétérol

Anti VHC
- Glécaprévir
- Pibrentasvir

Anticoagulants
- Rivaroxaban
- Vorapaxar

Stéroïdes
- Dexaméthasone
- Prednisolone

Antagonistes endothéline
- Bosentan
- Riociguat

Dérivés d'amphétamine

MINISTÈRE
DES SOLIDARITÉS
ET DE LA SANTÉ
Liberté
Égalité
Fraternité

INTERACTIONS MEDICAMENTEUSES

PAXLOVID® contient du ritonavir, puissant inhibiteur du CYP3A et peut augmenter les concentrations plasmatique des médicaments métabolisés par le CYP3A

AUTRES INTERACTIONS ET FORMES D'INTERACTION *

* Tableaux issus du RCP donnés à titre indicatif et ne sont pas considérés comme une liste exhaustive de tous les médicaments possibles susceptibles d'interagir avec PAXLOVID®

Diminution des concentrations du médicament concomitant

Analgésiques
Méthadone
Morphine

Antiasthmatiques
Théophylline

Anticoagulants
R-Warfarine

Contraceptifs hormonaux
Ethinylestradiol

Sédatifs / Hypnotiques
Péthidine

Sevrage tabagique
Bupropion

Anti-infectieux
Voriconazole
Atovaquone

Antirétroviraux
Raltégravir
Zidovudine

Anticonvulsivants
Divalproex
Lamotrigine

Interactions non liées aux modifications de concentrations

Antituberculeux
Delamanide

Stéroïdes
Propionate de fluticasone
Budesonide
Triamcinolone

Substitution hormone thyroïdienne
Levothyroxine